

ATEROMIXOL/POLICOSANOL PPG, Indicado como terapia hipocolesterolemizante en pacientes con elevación de colesterol y triglicéridos. También se prescribe a pacientes con diabetes tipo 2 o no insulino dependiente. El tratamiento debe prescribirse cuando la dieta sola sea insuficiente para controlar los niveles séricos de colesterol total y LDC-C, deben descartarse antes otras causas como una diabetes mal controlada, síndrome nefrótico, hipotiroidismo o enfermedades hepáticas activas. Ha sido demostrado que el PPG administrado a dosis de 10mg/día durante 3 años redujo los eventos coronarios, cardiovasculares, cerebrovasculares, el total de eventos adversos severos y la mortalidad total respecto al placebo en ancianos.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquier componente de este medicamento, embarazo y lactancia.

POSOLOGÍA: Durante la terapia con PPG los pacientes deben mantener las condiciones de dieta, tal y como se establece para este tipo de terapia.

La dosis inicial recomendada es una tableta de 10 mg en el horario de la comida, ya que durante la noche la síntesis de colesterol se encuentra incrementada, en casos severos se recomienda usar esta posología como dosis de ataque. En casos refractarios y/o alto riesgo coronario pueden requerir 20 mg/día, la cual representa la dosis máxima recomendada hasta el presente para la indicación que se prescribe.

Durante el tratamiento deben chequearse periódicamente cada 3 meses los niveles de colesterol sérico. Como antiagregante plaquetario se recomienda el uso diario de dosis de 10 a 20 mg/día, una tableta preferiblemente en el desayuno debido a que en este horario la agregación plaquetaria se encuentra incrementada.

Para más información y adquirir nuestros productos, visite nuestra página

www.healthenergy.com.co

Comuníquese a nuestro Tel/Wpp principal +57-3108849505

Hacemos envíos nacionales e internacionales.